УДК 612.332.7–02:616.36–002:616.363

ИЗМЕНЕНИЯ КИШЕЧНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ ГЕПАТИТОМ И СИНДРОМОМ ПЕРЕКРЕСТА

Акберова Д. Р.¹, Кошкин С. А.², Одинцова А. Х.³, Абдулганиева Д. И.¹¹ ГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ² ФГАОУ ВО КФУ, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»³ ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»

ASSESSMENT OF THE INTESTINAL PERMEABILITY IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE HEPATITIS AND OVERLAP SYNDROME

Akberova D. R.¹, Koshkin S. A.², Odintsova A. H.³, Abdulganieva D. I.¹¹ Kazan State Medical University² Kazan (Volga region) Federal University³ Republican Clinical Hospital

**Акберова
Диляра Рашатовна**
Akberova Dilyara R.
dile4ek@mail.ru

Акберова Диляра Рашатовна — очный аспирант кафедры госпитальной терапии
Кошкин Сергей Алексеевич — инженер отдела доклинических исследований Научно-образовательного центра фармацевтики
Абдулганиева Диана Ильдаровна — д.м.н., завед. кафедрой госпитальной терапии
Одинцова Альфия Харисовна — к.м.н., зав. отделением гастроэнтерологии

Резюме

В статье проведена комплексная оценка кишечной проницаемости у пациентов с аутоиммунным гепатитом (АИГ) и синдромом перекреста (СП). В исследование проспективно было включено 82 человек: 26 пациентов с АИГ, 26 — с СП и 30 здоровых добровольцев. Всем включенным в исследование проводился тройной сахарный тест. Выявлено повышение тонкокишечной проницаемости у пациентов с АИГ 0,11 [0,075; 0,18] ($p < 0,001$) и СП — 0,2 [0,088; 0,3] ($p < 0,001$) по сравнению с группой контроля 0,013 [0,01; 0,025]. У пациентов на стадии цирроза печени, с наличием синдрома портальной гипертензии и печеночно-клеточной недостаточности были установлены более выраженные изменения кишечной проницаемости в виде повышения проницаемости тонкой и толстой кишки.

Ключевые слова: кишечная проницаемость, аутоиммунный гепатит, синдром перекреста, отношение лактулоза/маннитол, сукралоза, тройной сахарный тест

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2017; 142 (6): 44–47

Summary

The article presented complex assessment of intestinal permeability in patients with autoimmune hepatitis (AIH) and overlap syndrome (OS). The study included 82 people: 26 patients with AIH, 26 — with OS and 30 healthy controls. All included into the study underwent a triple sugar test. There was increasing of small intestinal permeability in patients with AIH 0,11 [0,075; 0,18] ($p < 0,001$) and OS 0,2 [0,088; 0,3] ($p < 0,001$), comparing with control group 0,013 [0,01; 0,025]. In patients with cirrhosis, portal hypertension and liver failure intestinal permeability changes were more prominent — increasing small bowel and colonic permeability.

Key words: intestinal permeability, autoimmune hepatitis, overlap syndrome, lactulose/mannitol ratio, sucralose, triple sugar test

Ekspierimental'naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya 2017; 142 (6): 44–47

Введение

Аутоиммунные заболевания печени, к которым относится аутоиммунный гепатит (АИГ) и синдром перекреста (СП) являются хроническими паренхиматозными заболеваниями печени с наименее ясным патогенезом и крайне вариабельными вариантами течения [1,2]. В настоящее время активно изучается вопрос о пусковых механизмах развития аутоиммунных заболеваний печени, особенностях прогрессирования, возможностях эффективной терапии [3].

Иммуно-воспалительные заболевания в настоящее время рассматриваются, как заболевания,

тесно ассоциированные с изменением кишечного микробиома [4]. Состояние кишечной проницаемости (КП) является одними из факторов, тесно вовлеченных во взаимосвязь «кишечник-печень» [5]. КП изучалась у пациентов с алкогольным, вирусным поражением печени, единичные работы при неалкогольной болезни печени [6].

Целью нашего исследования являлась оценка кишечной проницаемости тройным сахарным тестом у пациентов с различными клиническими вариантами течения АИГ и СП.

Материал и методы

В исследование проспективно было включено 82 человека – 52 пациента с аутоиммунными заболеваниями печени (26 пациентов с АИГ, 26 пациентов с СП) и 30 здоровых добровольцев, не принимающих какие-либо лекарственные препараты и не имеющих родственников с аутоиммунными заболеваниями печени. Проведение исследования было одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ.

Постановку диагноза, классификацию больных проводили в соответствии с современными рекомендациями: АИГ – AASLD (2010) [1], АИГ/ПБЦ – IAING (2011) [2]. Средний возраст больных АИГ на момент включения в исследование составил $46,8 \pm 13,5$ лет, с СП – $48,7 \pm 9,8$ года, в контрольной группе – $48,6 \pm 9,2$ лет.

Для оценки КП нами проводился тройной сахарный тест. Изучение тонкокишечной проницаемости проводилось с помощью отношения лактулоза/маннитол мочи [7], толстокишечной проницаемо-

сти – содержания сукралозы в моче (нмоль/л) [8]. Содержание сахаров в моче определялось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Для пробоподготовки мочи применяли методику на основе работ Camilleri M. et al., 2010 [9]. Анализ проводится на хроматографе Agilent 1260 Infinity (Agilent Technologies, Inc., USA), сопряженном с масс-спектрометром AB Sciex 5600 (AB Sciex, USA).

Статистическая обработка и анализ полученных данных проводился при помощи прикладных программ IBM SPSS версия 23 (Чикаго, Иллинойс, США), Statistica версия 12.5 (Statsoft) и Microsoft Excel 2013. Распределение изучаемых параметров было отличным от нормального, поэтому описание признаков представлено в виде Me [Q1; Q3], где Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартиль соответственно. Для парного сравнения был использован критерий Манна–Уитни. Полученные различия считали статистически значимым при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение

У пациентов с аутоиммунными заболеваниями печени нами было выявлено повышение тонкокишечной проницаемости. Так, при АИГ отношение лактулоза/маннитол составило 0,11 [0,075; 0,18] ($p < 0,001$), при СП – 0,2 [0,088; 0,3] ($p < 0,001$) по сравнению с группой контроля 0,013 [0,01; 0,025] (Рисунок 1). У пациентов с АИГ наблюдалась тенденция к повышению показателя сукралозы 873,6 [574,4; 2016]. Толстокишечная проницаемость у пациентов с СП была сопоставима с группой контроля – 769,6 [424; 1680] и 785,6 [408; 1027,2] соответственно.

Нами были изучены изменения КП при различных клинических вариантах АИГ (Таблица 2).

При сравнительном анализе показателей КП в зависимости от стадии поражения печени пациенты с АИГ были разделены группы гепатита и цирроза печени (ЦП). Так у пациентов с гепатитом отношение лактулоза/маннитол составило 0,15 [0,11; 0,2], что отличалось от группы контроля ($p < 0,001$), толстокишечная проницаемость на стадии гепатита была сопоставима с группой контроля – 574,4 [372,8; 820,8]. У пациентов с ЦП в исходе АИГ было выявлено повышение как тонкокишечной – 0,09

[0,07; 0,17] ($p < 0,05$), так и толстокишечной проницаемости – 1091,2 [760; 2352] ($p < 0,05$) по сравнению с группой контроля. Таким образом, у пациентов с ЦП в исходе АИГ, в отличие от стадии гепатита, было выявлено повышение как тонкокишечной, так и толстокишечной проницаемости. Известно, что при циррозе, одним из основных факторов, способствующих изменению плотных контактов, является повышенная продукция фактора некроза опухоли- α (TNF- α) моноцитами в мезентериальных лимфоузлах [10], что может косвенно отражаться изменением КП в группе наших пациентов с ЦП.

Аналогичные достоверные изменения проницаемости как тонкой, так и толстой кишки были выявлены у пациентов с такими осложнениями как портальная гипертензия и печеночно-клеточная недостаточность

Проницаемость тонкой кишки у пациентов с АИГ была повышена вне зависимости от длительности, наличия внепеченочных проявлений, активности процесса.

Интересным фактом явилась стабилизация тонкокишечной проницаемости у пациентов с АИГ

Рисунок 1.
Тонкокишечная проницаемость у пациентов с АИГ и СП.

Таблица 1
Показатели КП у пациентов с АИГ зависимости от клинических проявлений заболевания и проводимой терапии

Заболевание/признак	N	Лактулоза/маннитол	Сукралоза, нмоль/л
Все	26	0,17 [0,07; 0,178] **	873,6 [555,2; 2016]
АИГ			
гепатит	7	0,15 [0,11; 0,2] **	574,4 [372,8; 820,8]
ЦП	19	0,09 [0,07; 0,17] *	1091,2 [760; 2352] *
ЦП по Чайлд-Пью			
Класс А	2	0,06 [0,057; 0,075]	2398,4 [764,8; 4032]
Класс В	9	0,02 [0,01; 0,085] **	851,2 [573,6; 1207,2] *
Класс С	8	0,019 [0,01; 0,11] **	788,8 [408; 1091,2]
Длительность			
До 1 мес	8	0,077 [0,057; 0,09] **	994,4 [807,2; 1952]
1–6 мес	9	0,17 [0,115; 0,23] **	760 [460,8; 1396,8]
6 мес-1 год	6	0,118 [0,09; 0,21] **	1204 [372,8; 2176]
Активность			
Активная	23	0,115 [0,069; 0,21] **	897,6 [555,2; 2176]
Неактивная	3	0,101 [0,09; 0,12] **	849,6 [342,4; 1888,6]
Осложнения			
с ПГ	13	0,1 [0,08; 0,13] **	1396,8 [849,6; 2352] ** ^a
С ПКН	7	0,11 [0,08; 0,178] **	1398,8 [1019,2; 2544] **
Внепеченочные проявления			
с суставным синдромом	13	0,1 [0,075; 0,12] *	849,6 [648; 1888] ^b
С АИТ	5	0,12 [0,06; 0,21] *	372,8 [342,4; 648] ^b
Терапия			
УДХК	6	0,11 [0,1; 0,17] **	956 [555,2; 1888]
С ГКС	15	0,11 [0,07; 0,23]	849,6 [508,8; 2176]
АЗА	5	0,08 [0,075; 0,12] **	1396,8 [764,8; 2016]
Контроль	21	0,013 [0,01; 0,025]	785,6 [408; 1027,2]

Примечание.
* $p < 0,05$ по сравнению с группой контроля;
** $p < 0,001$ по сравнению с группой контроля,
^a – $p < 0,05$ при сравнении с пациентами без ПГ;
^b – $p < 0,05$ при сравнении с пациентами без АИТ.

получающих глюкокортикостероиды – отношение лактулоза/маннитол составило 0,11 [0,07; 0,23], что сопоставимо с контрольной группой.

При анализе клинических вариантов течения СП и состояния КП нами было показано, что у пациентов на стадии гепатита была повышена только тонкокишечная проницаемость – 0,19 [0,13; 0,3] ($p < 0,001$) (Таблица 2). У пациентов с ЦП в исходе СП было обнаружено повышение как тонкокишечной 0,18 [0,086; 0,3] ($p < 0,05$) и толстокишечной проницаемости 880 [424; 1680] ($p < 0,05$).

Вне зависимости от длительности, активности заболевания, внепеченочных проявлений у всех пациентов с СП была повышена тонкокишечная проницаемость (Таблица № 2).

Выявленное стойкое повышение проницаемости тонкой кишки при различных вариантах течения АИГ и СП, усугубление изменения КП при ЦП и наличия осложнений позволяет предположить, что повышенная КП является фактором участвующим как в патогенезе, так и прогрессировании заболевания.

	Заболевание/признак	N	Лактулоза/маннитол	Сукралоза, нмоль/л
СП	Все	26	0,2 [0,088; 0,3] **	769,6 [424; 1680]
	гепатит	8	0,19 [0,13; 0,3] **	733,6 [506,4; 1420,8]
	ЦП	18	0,18 [0,086; 0,3] *	880 [424; 1680] *
Длительность	До 1 мес	4	0,13 [0,05; 0,261] **	894,4 [476,8; 1693,6]
	От 1 до 6 мес	7	0,268 [0,097; 0,284] **	840 [624; 2768]
	От 6 мес до 1 года	4	0,114 [0,072; 0,245] **	703,2 [454,4; 1009,6]
Активность	От 1 до 5 лет	9	0,205 [0,099; 0,3] **	649,6 [424; 1680]
	Активная	23	0,205 [0,088; 0,284] **	777,6 [483,4; 2064]
	Неактивная	3	0,14 [0,086; 0,316] **	422,4 [384; 1083,2]
Осложнения	с ПГ	8	0,18 [0,09; 0,304] **	772 [404,8; 1053,6]
	без ПГ	18	0,19 [0,065; 0,28] **	769,6 [424; 2304]
	с суставным синдромом	13	0,17 [0,099; 0,27] *	920 [624; 1680] b
Внепеченочные проявления	без суставного синдрома	13	0,2 [0,088; 0,28] *	649,6 [424; 1024]
	С АИТ	11	0,17 [0,097; 0,3] *	422,4 [323,2; 1099,2] ^a
	Без АИТ	15	0,2 [0,086; 0,28] *	840 [649,6; 2304]
Терапия	УДХК	11	0,2 [0,97; 0,7] **	603,2 [323,2; 1099,2]
	С ГКС	14	0,18 [0,06; 0,28] **	808,8 [624; 2064]
	Контроль	21	0,013 [0,01; 0,025]	785,6 [408; 1027,2]

Таблица 2

Особенности изменения КП у пациентов с СП в зависимости от клинических проявлений заболевания и проводимой терапии

Примечание.

* $p < 0,05$ по сравнению с группой контроля;
 ** $p < 0,001$ по сравнению с группой контроля,
^a – $p < 0,05$ при сравнении с пациентами без АИТ.

Выводы

1. У пациентов с аутоиммунными заболеваниями печени как на стадии гепатита ($p < 0,001$), так и на стадии цирроза ($p < 0,001$) было установлено повышение проницаемости тонкой кишки. У пациентов при различных нозологиях – АИГ, СП вне зависимости от дебюта ($p < 0,001$), длительности заболевания ($p < 0,001$), активности ($p < 0,001$), наличия внепеченочных проявлений ($p < 0,001$) было выявлено повышение тонкокишечной проницаемости.
2. При прогрессировании аутоиммунного гепатита и синдрома перекреста в цирроз печени было выявлено повышение как тонкокишечной, так и толстокишечной проницаемости.
3. При аутоиммунном гепатите установлены более выраженные изменения кишечной проницаемости – повышение проницаемости тонкой и толстой кишки при присоединении осложнений цирроза печени – синдрома портальной гипертензии и синдрома печеночно-клеточной недостаточности.

Литература

1. Manns M. P. Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis / M.P. Manns, A.J. Czaja, J.D. Gorham et al // Hepatology. – № 51(6). – С. 2193–2213.
2. Boberg K. M. Overlap syndromes: The International Autoimmune Hepatitis Group (IAIHG) position statement on a controversial issue / K.M. Boberg, R.W. Chapman, G.M. Hirschfield et al. // Journal of Hepatology. – 2011. – № 54 – С. 374–385.
3. Ивашкин В. Т. Аутоиммунные заболевания печени в практике клинициста. / В.Т. Ивашкин, А.О. Буевров // 2-е изд. М. Изд. дом «М-Вести». – 2011
4. Czaja A. J. Factoring the intestinal microbiome into the pathogenesis of autoimmune hepatitis / A.J. Czaja // World Journal of Gastroenterology – 2016 – № 22(42) – С. 9257–9278.
5. Lin R. Abnormal intestinal permeability and microbiota in patients with autoimmune hepatitis / R. Lin, L. Zhou, J. Zhang, et al. // Int J Clin Exp Pathol – 2015. – № 8(5). – С. 5153–5160.
6. Liboredo J. C. Nutrition status and intestinal permeability in patients eligible for liver transplantation. / J.C. Liboredo, E.G. Vilela, M.L. Ferrari et al // J Parenter Enteral Nutr. –2015. № 39. – С. 163–170.
7. Swanson G. R. Is moderate red wine consumption safe in inactive inflammatory bowel disease? /Swanson G.R., Tieu V., Shaikh M., et al.// Digestion. – 2011. – № 84(3). – С. 238–244.
8. Vilela E. G. Gut permeability to lactulose and mannitol differs in treated Crohn's disease and celiac disease patients and healthy subjects/ Torres H. O., Ferrari M. L., Lima A. S. et al.// Braz J Med Biol Res. – 2008. – № 41(12). – С. 1105–1109.
9. Camilleri M. Understanding measurements of intestinal permeability in healthy humans with urine lactulose and mannitol excretion/ Camilleri M., Nadeau A., Lamsam J. et al.// Neurogastroenterol. Motil. – 2010. – № 22(1). – С. 15–26.
10. Tsiaoussis G. I. Intestinal barrier dysfunction in cirrhosis: Current concepts in pathophysiology and clinical implications/ Tsiaoussis G. I., Assimakopoulos S. F., Tsamandas A. C. et al.// World J Hepatol. – 2015. – № 7(17). – С. 2058–2068.